

# Inmunomediadas en ADOLESCENTES

Abordaje del  
adolescente.com

**alopecia  
areata**



Abordaje del  
adolescente con  
**alopecia  
areata**

CASOS

[carolinasusana.prat@sjd.es](mailto:carolinasusana.prat@sjd.es)

Inmunomediadas en



**ADOLESCENTES**

## CASO 3



Inmunomediadas en



ADOLESCENTES

## CASO 3



de 14 años diagnosticado hace un año de AA en placas


### Antecedentes familiares:

2 Tías paternas: nódulos tiroideos y neoplasia de tiroides

Derivado de dermatólogo privado por falta de respuesta a tratamiento tópico y valorar inicio de sistémico

## CASO 3. Situación familiar


- Padres separados
- Acuden los dos padres a la consulta
- Discuten frente al niño
- Difícil llegar a consenso en cuanto a los tratamientos




## CASO 3. Situación familiar

# ¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR?

- Padres separados
- Acuden los dos padres a la consulta
- Discuten frente al niño
- Difícil llegar a consenso en cuanto a los tratamientos



# CASO 3



\*Olumiant® (baricitinib) comercializado por ELI LILLY NEDERLAND B.V. Baricitinib está indicado para el tratamiento de la alopecia areata grave en pacientes adultos


1. Rudnicka L, et al. **European expert consensus statement on the systemic treatment of alopecia areata.** J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Jan 2. doi: 10.1111/jdv.19768

# CASO 3



Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**

Abordaje del  
adolescente.com  
**alopecia  
areata**



**Semana 0**



**Farmacia hace visita de educación**

**Semana 4**



**No AES, AG ok**




**Semana 12**



**No Aes, AG ok**



**RESPONDEDOR  
RÁPIDO**



## CASO 3

¿ Cuánto tiempo se recomienda esperar para detener el tratamiento con inhibidores de jak por no respuesta?

1- 4 meses

2- 6 meses

3- 8 meses

4- 12 meses



## CASO 3

¿ Cuánto tiempo se recomienda esperar para detener el tratamiento con inhibidores de jak por no respuesta?

1- 4 meses

2- 6 meses

3- 8 meses

4- **12 meses**



## CASO 3

- RITLECITINIB es el primer fármaco aprobado para AA en la edad pediátrica
- Ha supuesto un cambio radical en el abordaje terapéutico de los niños con AA
- Eficacia: 50% consiguen SALT <20 en semana 48
- Seguridad: cefalea, acné y nasofaringitis
- Necesitamos conocer la experiencia en vida real
- Respondedores lentos y rápidos
- No responder a un inhibidor de Jak no predispone a la falta de respuesta a Ritlecitinib



CASO 4



SJD

Inmunomediadas en



ADOLESCENTES

## CASO 4



- Padres naturales de Marruecos
- Sin antecedentes familiares de interés
- Alopecia Areata a los 2 años de vida.



# CASO 4

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**


Abordaje del  
adolescente con  
**alopecia  
areata**



## CASO 4

### ¿Qué tratamiento pautarías?

- 1- Propionato de clobetasol 0,05% dos veces al día durante 6 meses
- 2- Propionato de clobetasol 0,05% una vez al día (6 semanas si 6 semanas no) durante 6 meses
- 3- Propionato de clobetasol 0,05% + minoxidil 5% dos veces al día durante 6 meses
- 4- No trataría



## CASO 4

### ¿Qué tratamiento pautarías?

- 1- Propionato de clobetasol 0,05% dos veces al día durante 6 meses
- 2- Propionato de clobetasol 0,05% una vez al día (6 semanas si 6 semanas no) durante 6 meses
- 3- Propionato de clobetasol 0,05% + minoxidil 5% dos veces al día durante 6 meses
- 4- No trataría



# CASO 4

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**

Abordaje del  
adolescente con  
**alopecia  
areata**



CLARELUX + MEDEBIOTIN diario durante 4 meses

## CASO 4



¿Qué tratamiento iniciaríais?

- 1- Metotrexato semanal
- 2- Pauta continua de prednisona oral
- 3- Pulsos de dexametasona o prednisolona oral
- 4- Minoxidil oral

Marzo 2016

## CASO 4



¿Qué tratamiento iniciaríais?

- 1- Metotrexato semanal
- 2- Pauta continua de prednisona oral
- 3- Pulsos de dexametasona o prednisolona oral
- 4- Minoxidil oral

Marzo 2016

# CASO 4. PREDNISOLONA

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**

Abordaje del  
adolescente con  
**alopecia  
areata**



Marzo 2016



Junio 2016



Agosto 2016

## CASO 4



- Descenso de estilsona
- Recaída
- Propionato de clobetasol 0,05% + minoxidil 5%



# CASO 4

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**

Abordaje del  
adolescente.con  
**alopecia  
areata**



# CASO 4. DIFENCIPRONA. 2017

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**


Abordaje del  
adolescente con  
**alopecia  
areata**




# CASO4. ANTRALINA 1% 2018

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**

Abordaje del  
adolescente.com  
**alopecia  
areata**



# CASO 3




\*Olumiant® (baricitinib) comercializado por ELI LILLY NEDERLAND B.V. Baricitinib está indicado para el tratamiento de la alopecia areata grave en pacientes adultos

1. Rudnicka L, et al. **European expert consensus statement on the systemic treatment of alopecia areata.** J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Jan 2. doi: 10.1111/jdv.19768

# CASO 4. RITLECINITIB 50mg/día. 6 meses

Inmunomediadas en **ADOLESCENTES**

Abordaje del  
adolescente con  
**alopecia  
areata**



SALT 90  
ELA3  
EBA3

## CASO 4

En este caso obtener una buena respuesta clínica es complicado

¿ Es perjudicial ser optimista y dar esperanzas cuando quizás no saldrá más el pelo?

¿ Cómo hay que enfocar la respuesta al tratamiento?

